

## 사용상의 주의사항

### 1. 전문의약품(경구)(주사)

#### ‘부작용’ 항

<추가> 1) 중대한 부작용

① 속, 과민증(0.1% 미만) : 속, 과민증([아나필락시스](#), 호흡곤란, 전신조흥, 맥관부종<안면부종, 인두부종 등>, 두드러기 등)을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

#### ‘이상반응’ 항

<추가> 1) 중대한 이상반응

① 속, 과민증(0.1% 미만) : 속, 과민증([아나필락시스](#), 호흡곤란, 전신조흥, 맥관부종<안면부종, 인두부종 등>, 두드러기 등)을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

### 2. 일반의약품

‘다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것’ 항

<추가> 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.

① 과민증: 속, [아나필락시스](#), 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등

파모티딘 성분 제제 허가사항 변경대비표

1) 전문의약품(경구)(주사)

항목	기허가 사항	변경(안)
이상 반응(부작용)	1) 중대한 이상반응(부작용) ① 속, 과민증(0.1% 미만) : 속, 과민증(<추가>, 호흡곤란, 전신조흥, 맥관부종<안면부종, 인두부종 등> 두드러기 등)을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.	1) 중대한 이상반응(부작용) ① 속, 과민증(0.1% 미만) : 속, 과민증( <u>아나필락시스</u> , 호흡곤란, 전신조흥, 맥관부종<안면부종, 인두부종 등> 두드러기 등)을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

\* 품목별로 '이상반응'항 또는 '부작용'항으로 기재

2) 일반의약품

항목	기허가 사항	변경(안)
다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것	(생략) 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우, 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다. ① 과민증: 속, <추가>, 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등	(기허가 사항과 동일) 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우, 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다. ① 과민증: 속, <u>아나필락시스</u> , 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등